

## **Cáncer de vesícula biliar - Factores de riesgo** [1]

Esta sección ha sido revisada y aprobada por la [Junta editorial de Cancer.Net](#) [2], 09/2014

**EN ESTA PÁGINA:** Encontrará más información acerca de los factores que aumentan la posibilidad de desarrollar este tipo de cáncer. Para ver otras páginas, utilice el menú ubicado al lado de la pantalla.

Un factor de riesgo es todo aquello que aumenta la probabilidad de que una persona desarrolle cáncer. Si bien, a menudo, los factores de riesgo influyen en el desarrollo del cáncer, la mayoría no provoca cáncer en forma directa. Algunas personas que tienen varios factores de riesgo nunca desarrollan cáncer, mientras que sí lo hacen otras personas sin factores de riesgo conocidos. Sin embargo, conocer sus factores de riesgo y hablar con su médico al respecto puede ayudarle a tomar decisiones más informadas sobre el estilo de vida y la atención médica.

Los siguientes factores pueden elevar el riesgo que tiene una persona de desarrollar cáncer de vesícula biliar:

**Cálculos biliares.** Los cálculos biliares son el factor de riesgo más común de cáncer de vesícula. Estos son formaciones de colesterol y sales biliares que pueden presentarse en la vesícula o el conducto biliar. Los cálculos biliares son la enfermedad digestiva más común en los Estados Unidos y entre el 75 % y el 90 % de las personas con cáncer de vesícula tienen antecedentes de cálculos biliares. Sin embargo, solo una pequeña proporción de personas con cálculos biliares desarrolla cáncer de vesícula.

**Pólipos de vesícula biliar.** Este tipo de pólipo es un crecimiento que a veces se forma cuando se enquistan cálculos biliares en la pared de la vesícula. Los pólipos de vesícula biliar protruyen hacia adentro en la pared interior de la vesícula. Algunos pólipos también pueden ser consecuencia de inflamación. Los médicos a menudo recomiendan la extirpación de la vesícula en las personas que tienen pólipos de más de un centímetro, porque estos tienen más probabilidad de ser cancerosos.

**Edad.** La mayoría de los pacientes con diagnóstico de cáncer de vesícula tienen más de 70 años.

**Sexo.** Las mujeres tienen el doble de probabilidades de desarrollar cáncer de vesícula en comparación con los hombres.

**Etnia.** Los estadounidenses de origen mexicano e indio, sobre todo del sudoeste de los Estados Unidos, son más propensos a desarrollar cáncer de vesícula biliar que la población en general.

**Tabaquismo [3].** El consumo de tabaco puede aumentar el riesgo de cáncer de vesícula.

**Antecedentes familiares.** Los antecedentes familiares de cáncer de vesícula aumentan levemente el riesgo de que una persona tenga este tipo de cáncer.

*Para continuar leyendo esta guía, utilice el menú ubicado al lado de su pantalla para seleccionar otra sección.*

---

**Links:**

[1] <http://www.cancer.net/node/18166>

[2] <http://www.cancer.net/about-us>

[3] <http://www.cancer.net/es/node/18378>