Leucemia - mieloide aguda - AML - infantil - Signos y Síntomas

Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [1], January / 2013

Signos y síntomas

Los niños con AML pueden tener los siguientes síntomas o signos. A veces, los niños con esta enfermedad no manifiestan ninguno de estos síntomas. O bien, estos síntomas pueden producirse por otra afección que no sea cáncer. Si le preocupa un síntoma o signo de esta lista, hable con el médico de su hijo.

Los signos y síntomas tempranos de la AML se pueden parecer en gran medida a los de la gripe u otras enfermedades comunes de la infancia. La mayoría de los signos y síntomas de la AML son el resultado de una producción deficiente de células sanguíneas normales por parte de la médula ósea y la acumulación de células cancerosas de AML. Con frecuencia, un niño con AML tendrá uno o más de los siguientes síntomas:

- Fiebre
- Escalofríos
- Dolor de huesos y articulaciones
- Ganglios linfáticos inflamados
- Hemorragias y aparición de hematomas frecuentes
- Palidez
- Fatiga

El médico le hará preguntas sobre los síntomas que experimenta su hijo para ayudar a encontrar la causa del problema, lo que se conoce como diagnóstico [2]. Este puede incluir el tiempo que hace que su hijo tiene los síntomas y con qué frecuencia.

Si se diagnostica cáncer, el alivio de los síntomas y los efectos secundarios sigue siendo un aspecto importante de los cuidados y el tratamiento para la enfermedad. Esto también puede recibir el nombre de manejo de los síntomas, cuidados paliativos o atención médica de apoyo. Recuerde hablar con el equipo de cuidados médicos de su hijo sobre los síntomas que el niño experimenta, incluidos los síntomas nuevos o cualquier cambio en ellos.

Links:
[1] http://www.cancer.net/about-us
[2] http://www.cancer.net/node/18252