

Tumor del sistema nervioso central - cáncer infantil - Factores de riesgo

Esta sección ha sido revisada y aprobada por la [Junta editorial de Cancer.Net](#) [1], May / 2013

Factores de riesgo

EN ESTA PÁGINA Obtendrá más información sobre qué factores aumentan la posibilidad de desarrollar un tumor del SNC. Para ver otras páginas de esta guía, utilice las casillas de color ubicadas a la derecha de la pantalla o haga clic en [?Siguiente?](#) en la parte inferior.

Un factor de riesgo es cualquier factor que aumenta la posibilidad de que una persona desarrolle un tumor. Si bien los factores de riesgo, a menudo, influyen en el desarrollo de un tumor, la mayoría no es una causa directa de su formación. Algunas personas que tienen varios factores de riesgo nunca desarrollan un tumor, mientras que sí lo hacen otras personas sin factores de riesgo conocidos.

Se desconoce cuál es la causa de la mayoría de los tumores del SNC en los niños. Los investigadores están estudiando diversas causas posibles de los tumores del SNC, entre ellas, los virus. Distintos tipos de tumores del SNC se desarrollan en diferentes grupos de edad; por ejemplo, algunos tipos de tumores del SNC son más comunes en niños menores de tres años. Aparentemente, una lesión en la cabeza no causa un tumor del SNC.

Una pequeña cantidad de tumores del SNC se producen en familias. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de niños con tumores cerebrales presentan una causa genética reconocible, generalmente asociada a una enfermedad familiar denominada neurofibromatosis. La neurofibromatosis es un trastorno hereditario que produce neurofibromas (tumores no cancerosos) en los nervios periféricos del cuerpo, manchas marrones en la piel y anomalías de los tejidos y los huesos. La neurofibromatosis también se conoce como enfermedad de Recklinghausen o de von

Recklinghausen. Obtenga más información sobre la [neurofibromatosis tipo 1](#) [2] (en inglés) y la [neurofibromatosis tipo 2](#) [3] (en inglés). Otros trastornos genéticos menos comunes asociados con un riesgo más elevado de tumores del SNC incluyen [síndrome de Li-Fraumeni](#) [4] (en inglés), [esclerosis tuberculosa](#) [5] (en inglés), [síndrome de nevos basocelulares](#) [6] (en inglés) y [síndrome de Turcot](#) [7] (en inglés).

Seleccione [?Siguiente?](#) (abajo, a la derecha) para continuar leyendo esta guía y obtener más información sobre qué síntomas puede causar un tumor del SNC. O bien, utilice las casillas de color ubicadas a la derecha de la pantalla para visitar una sección.

Links:

- [1] <http://www.cancer.net/about-us>
- [2] <http://www.cancer.net/node/19450>
- [3] <http://www.cancer.net/node/19451>
- [4] <http://www.cancer.net/node/19133>
- [5] <http://www.cancer.net/node/19686>
- [6] <http://www.cancer.net/node/19452>
- [7] <http://www.cancer.net/node/19307>