Cancer.Net®

Oncologist-approved cancer information from the American Society of Clinical Oncology

PDF generated on June 21, 2016 from
http://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/sarcoma-de-tejido-blando/factores-de-riesgo

Sarcoma de tejido blando - Factores de riesgo [1]

Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 07/2014

EN ESTA PÁGINA: Obtendrá más información sobre los factores que aumentan las probabilidades de padecer este tipo de cáncer. Para ver otras páginas, use el menú al costado de la pantalla.

Un factor de riesgo es cualquier factor que aumenta la posibilidad de que una persona desarrolle cáncer. Si bien los factores de riesgo a menudo influyen en el desarrollo del cáncer, la mayoría no es una causa directa de esta enfermedad. Algunas personas que tienen varios factores de riesgo nunca desarrollan cáncer, mientras que sí lo hacen otras personas sin factores de riesgo conocidos. Sin embargo, el hecho de conocer sus factores de riesgo y consultar a su médico al respecto puede ayudarle a tomar decisiones más fundamentadas sobre estilo de vida y cuidado de la salud.

En la mayoría de los sarcomas no se conocen las causas. Los siguientes factores pueden aumentar el riesgo que tiene una persona de desarrollar sarcoma:

Radioterapia previa. Las personas que han recibido radioterapia para un cáncer previo tienen un riesgo levemente mayor de desarrollar sarcoma más adelante.

Genética. Las personas con ciertas enfermedades hereditarias corren un mayor riesgo de padecer sarcoma. Estas enfermedades incluyen neurofibromatosis tipo 1 [3] (en inglés), también se llama la enfermedad de Von Recklinghausen; síndrome de Gardner [4] (en inglés); síndrome de Werner [5] (en inglés); esclerosis tuberosa [6] (en inglés); síndrome de carcinoma nevoide de células basales [7] (en inglés); síndrome de Li-Fraumeni [8] (en inglés); y retinoblastoma [9] (en inglés).

Sustancias químicas. La exposición laboral al cloruro de vinilo monómero que se usa en la fabricación de algunos tipos de plástico o la dioxina puede aumentar el riesgo de sarcoma. Sin embargo, no se conoce que la mayoría de los sarcomas estén asociados a riesgos ambientales determinados.

Para continuar leyendo esta guía, use el menú al costado de la pantalla para seleccionar otra sección.

Links
[1] http://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/sarcoma-de-tejido-blando/factores-de-riesgo
[2] http://www.cancer.net/es/node/51
[3] http://www.cancer.net/node/19450
[4] http://www.cancer.net/node/18869
[5] http://www.cancer.net/node/19726
[6] http://www.cancer.net/node/19686
[7] http://www.cancer.net/node/19452
[8] http://www.cancer.net/node/19133
[9] http://www.cancer.net/node/31381